ВНУТРИЧЕРЕПНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У ПАЦИЕНТА С МОЗАИЧНОЙ ТРИСОМИЕЙ ПО 8 ХРОМОСОМЕ: ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЭПОПЕЯ

В. В. Ушанов, М. С. Николаенко, А. П. Герасимов

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Санкт-Петербург

РЕЗЮМЕ. Описан клинический случай хирургического лечения внутричерепной гипертензии у ребенка с трисомией по 8 хромосоме. Отражена клиническая динамика и последовательность операций. Показан диагностический алгоритм при несоответствии клинической картины первичным цитогенетическим данным. Представленный случай важен как прецедент успешного нейрохирургического лечения пациента с мозаичным характером мутации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: внутричерепная гипертензия, нарушения ликвородинамики, хромосомный мозаицизм, 8 хромосома, нейрохирургия, пороки развития.

Для цитирования: Ушанов В. В., Николаенко М. С., Герасимов А. П. Внутричерепная гипертензия у пациента с мозаичной трисомией по 8 хромосоме: диагностическая и хирургическая эпопея. Российский нейрохирургический журнал им. проф. А. Л. Поленова. 2022;14(1-2):108–111

INTRACRANIAL HYPERTENSION IN A PATIENT WITH MOSAIC TRISOMY ON CHROMOSOME 8: DIAGNOSTIC AND SURGICAL EPOPEE

V. V. Ushanov, M. S. Nicolaenko, A. P. Gerasimov

Almazov National Medical Research Centre, St. Petersburg

ABSTRACT. A clinical case of surgical treatment of intracranial hypertension in a child with trisomy 8 is described. The clinical dynamics and the sequence of operations are presented. A diagnostic algorithm is shown when the clinical picture does not match the primary cytogenetic data. The presented case is important as a precedent for successful neurosurgical treatment of a patient with a mosaic mutation.

KEY WORDS: intracranial hypertension, liquorodynamic disorders, chromosomal mosaicism, chromosome 8, neurosurgery, malformations.

For citation: Ushanov V. V., Nicolaenko M. S., Gerasimov A. P. Intracranial hypertension in a patient with mosaic trisomy on chromosome 8: diagnostic and surgical epopee. The Russian Neurosurgical Journal named after prof. A. L. Polenov. 2022;14(1-2):108–111

Введение.

Персонализированная медицина — это направление в лечении, основанное на индивидуальной потребности конкретного пациента. В рамках этой парадигмы большее внимание уделяется состояниям, обусловленным генетической природой. Широко известны заболевания с наличием мутации в каждой клетке организма. К сожалению, меньшее внимание уделяется различным формам мозаицизма. Мозаицизм ассоциирован с более легким или атипичным вариантом течения заболевания, а также подразумевает клиническую манифестацию в тех случаях, когда причинная мутация на конституциональном уровне определяла бы для пациента летальный исход [1].

Хромосомный мозаицизм и хромосомная нестабильность вносит значительный вклад в нормальное и патологическое пренатальное развитие у людей, так влияние численных хромосомных аномалий на гомеостаз клеток плода лежит в основе значительной части самопроизвольных аборт. Понимание происхождения, механизмов, последствий мозаицизма требует рассмотрения в онтогенетическом контексте [2]. С учетом вышесказанного интересным предполагается разбор клинического случая ребенка с хромосомным мозаицизмом трисомии по 8 хромосоме (синдром трисомии 8 хромосомы, синдром Варкани).

Мозаичная трисомия 8 — хромосомная аномалия с предполагаемой распространенностью от 1:25 000

до 1:50 000 и соотношением полов мужчины / женщины 5:1 [3,4]. Регулярная (полная) трисомия 8 летальна и составляет 0,7–0,8 % самопроизвольных аборт [5]. Этот синдром имеет широкую фенотипическую изменчивость. Формы, совместимые с жизнью, связаны с мозаицизмом. Характерными проявлениями являются от легкой до тяжелой умственной отсталости; кранио-лицевой дисморфизм: выступающий лоб, глубоко посаженные глаза, косоглазие (страбизм), гипертелоризм с широкой носовой линией и выступающими ноздрями, полные губы, вывернутая нижняя губа, микрогнатия, готическое небо, расщелина неба, оттопыренные уши с толстыми ушными раковинами; аномалии конечностей, в том числе камптодактилия, глубокие борозды на ладонях и подошвах стоп, одиночная поперечная борозда на ладони вальгус локтевых суставов; короткая и крыловидная шея, удлиненное туловище, деформации лопатки, грудины, узкий таз, дисплазия тазобедренного сустава, широко расположенные соски, аномалии в строении сердца, мочевыделительной системе [6].

Клинический случай

Ребёнок от шестой беременности (от второй — здоровый мальчик, остальные — медицинские аборты), протекала на фоне гестоза, на сроке 20 недель — угроза прерывания. Роды вторые, преждевременные, на сроке 34 недели. Низкая масса тела при рождении (1880 г), оценка по шкале Апгар: 7/8 б. Переведена в специализированное отделение для недоношенных детей, где были диагностированы: синдром трисомии хромосомы 8, внутренняя гидроцефалия, врожденный кератит, бельмо роговицы левого глаза, гипохромная анемия, открытое овальное окно, дополнительная хорда левого желудочка, эхо-признаки расщепленного типа строения чашечно-лоханочной системы слева, левосторонней пиелокаликэкстазии, не исключается удвоение левой почки.

Кариотип: 47, XX, +8

Из семейного анамнеза известно, что двоюродный брат по материнской линии, находился на стационарном лечении, по данным истории болезни — перинатальное поражение ЦНС, постгипоксическая нефропатия, малые аномалии развития. Генетическое обследование не проводилось.

По данным нейросонографии на первые сутки жизни — внутрижелудочковое кровоизлияние I ст. с 2-х сторон, тетраентрикулярная гидроцефалия. Клиническая картина в первые месяцы жизни представлена гипертензионным синдромом, задержкой речевого и психомоторного развития. Состояние оценивалось как постгеморрагическая тетраентрикулярная декомпенсированная гидроцефалия. Было выполнено вентрикуло-перитонеальное шунтирование справа системой Кодман 70 мм водн.ст. в правой точке Денди. Пациент выписан в компенсированном состоянии. Физическое развитие до года: гипотрофия, тяжелая задержка психомоторного развития.

Ухудшение состояния отмечалось в октябре 2020 в виде появления умеренного подкожного скопле-

ния в области перитонеального катетера на передней стенке брюшной полости. В начале февраля 2021 появились жалобы на эпизодическое беспокойство, рвоту. Выполнена компьютерная томография головного мозга, отмечается нарастание тетраентрикулярной гидроцефалии. По данным рентгенографии органов брюшной полости — вторичная возрастная миграция перитонеального катетера. В динамике отмечается нарастание вышеописанных жалоб.

В 2021 году пациентка в возрасте 3х лет и 7 месяцев госпитализирована повторно — состояние оценивалось как дисфункция шунтирующей системы вследствие вторичной возрастной миграции перитонеального катетера, клиническая картина представлена гипертензионным синдромом, общемозговой симптоматикой, задержкой речевого и психомоторного развития, по данным нейровизуализации — нарастание тетраентрикулярной гидроцефалии, местно отмечается подкожное скопление в проекции перитонеального катетера на передней брюшной стенке. Проведено оперативное вмешательство — ревизия, реимплантация перитонеального катетера.

При осмотре в послеоперационном периоде: долихоцефалия с выраженными лобными буграми, низко расположенные уши, готическое небо, деформированные зубы, тремы, микрогения, короткая шея, вальгус локтевых суставов, косолапость. Тяжелая задержка психомоторного развития. Сходящееся косоглазие. На протяжении последнего года — стабилизация показателей физического развития и психомоторного развития на уровне 2-го года жизни. В связи с несоответствием клинико-инструментальной картины и данных исходного цитогенетического исследования проведено цитогенетическое исследование на мозаицизм (биологический материал — клетки крови). Результат:

mos 47, XX, +8 [10] / 46, XX [5]

Обсуждение

Пренатальное развитие человека на ранних этапах сопровождается хромосомным мозаицизмом и хромосомной нестабильностью (до 70–90 % эмбрионов) [7]. Затем уровень мозаицизма уменьшается, что, вероятно, связано с формированием первичных зародышевых листков [8,9], и происходит по модели «bottleneck», подразумевая одновременное влияние на сокращения количества клеток с хромосомной нестабильностью как естественного клеточного отбора, так и посредством запрограммированной гибели таких клеток [2]. Но эффект мозаицизма на клеточный гомеостаз может привести к мозаичной хромосомной патологии с паттернами пороков развития после рождения. Ряд заболеваний мозга связаны с хромосомным мозаицизмом: нейропсихиатрические расстройства и расстройства нервного развития [2].

Особенностью вышеописанного клинического случая является наличие характерных для синдрома трисомии 8 задержки психомоторного развития, кранио-лицевого дисморфизма, вальгуса локтевых суставов, полных губы с вывернутой нижней губой,

короткая шея, аномалии в строении сердца, мочевыделительной системе, при отсутствии характерных борозд на ладонях и стопах, камптодактилии, крылообразной шеи, выступающих ушных раковин. Диагноз трисомии 8 был поставлен на основе полученных данных цитогенетического исследования (кариотипирования) культуры лимфоцитов периферической крови, где в клетках была обнаружена дополнительная хромосома 8 наряду с нормальной линией клеток. Примечательно, что процент мозаицизма в случае данной пациентки в препарате крови для исследования составил 66 %. Причиной возникновения мозаичного статуса может быть мейотическое нерасхождение (презиготическое) с частичной постзиготической потерей дополнительной хромосомы 8 или постзиготическое митотическое нерасхождение. Митотическое нерасхождение встречается чаще, что объясняет мозаицизм, длительную выживаемость и хороший клинический прогноз этих пациентов [10], что мы, вероятно, можем наблюдать в данном клиническом случае. По данным ряда теоретических работ и клинических наблюдений [2] выявлено, что процент мутантного клона в разных тканях может быть, различным.

Устранение хромосомных дисбалансов в период формирования первичных зародышевых листков и их производных предполагает существование тканеспецифичного мозаицизма. Так, молекулярно-генетический анализ тканей человека (например, мочевого пузыря, крови, груди, печени, легких, простаты, кожи, желудка и щитовидной железы) свидетельствует о мозаицизме, который различается по тканям, в том числе и в головном мозге [9,11,12]. Также описаны случаи мозаицизма с несколькими аномальными клонами, включая сочетание трисомии 8 и 21 [13]. Тем не менее, нет единого мнения о вкладе мозаицизма в нормальную или патологическую архитектуру ткани. Для мозга вклад мозаицизма может иметь особенности из-за организации центральной нервной системы, где каждый нейрон может образовывать до нескольких тысяч связей с другими нейронами, влияющими на их функционирование [2]. В описанном нами случае, у пациентки с 66 % клеток мутантного клона среди клеток крови отмечается задержка психомоторного развития. Однако ребенок способен ходить, непродолжительное время бегать и ограниченно коммуницировать с окружающими. Данные особенности позволяют предполагать, что процент нормальных клеток в других тканях, включая нервную ткань, может быть значительно выше.

Выявление хромосомного мозаицизма сильно зависит от используемой методики. При применении

молекулярно-цитогенетических методов показатели хромосомного мозаицизма значительно выше, чем показатели, выявленные с помощью цитогенетических анализов [2]. В тоже время стоит отметить, что цитогенетическая пренатальная диагностика обычно выполняется при беременности с повышенным риском хромосомных аномалий [14]. Так называемый мозаицизм низкого уровня, своеобразный след онтогенеза, может быть выявлен, вероятно, почти у всех новорожденных [15]. В случае описанной пациентки, с учетом известного характера мутации, представляется желательным исследование различных тканей методом интерфазной *FISH*.

Заключение

Мозаичный статус подразумевает более легкое течение, а также манифестацию заведомо летальных картин конституционального статуса. Количественный и качественный вклад мозаицизма в непосредственную манифестацию остается неизвестным. В тоже время процент мутантного клона может различаться в разных тканях. Описанный случай представляет интерес как наблюдение в динамике пациента, которое позволило уточнить цитогенетический диагноз, а также как важный прецедент успешного хирургического лечения больного с доказанным мозаицизмом.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. **Conflict of interest.** The author declares no conflict of interest.

Финансирование. Исследование проведено без спонсорской поддержки. **Financing.** The study was performed without external funding.

Соблюдение прав пациентов и правил биоэтики. Все пациенты подписали информированное согласие на участие в исследовании. **Compliance with patient rights and principles of bioethics.** All patients gave written informed consent to participate in the study.

Работа выполнена в рамках государственного задания № 121031100314-1

ORCID авторов / ORCID of authors:

Ушанов Всеволод Всеволодович /
Ushanov Vseslav Vsevolodovich
<https://orcid.org/0000-0002-4091-7396>

Николаенко Михаил Сергеевич /
Nikolaenko Michail Sergeevich
<https://orcid.org/0000-0003-0758-067X>

Герасимов Александр Павлович /
Gerasimov Alexandr Pavlovich
<https://orcid.org/0000-0001-9787-8132>

Литература/References

1. Moog U, Felbor U, Has C, et al. Disorders caused by genetic mosaicism. *Dtsch Arztebl Int* 2020; 117: 119–25. <https://doi.org/10.3238/arztebl.2020.0119>
2. Iourov, I.Y.; Vorsanova, S.G.; Yurov, Y.B., et al. Ontogenetic and Pathogenetic Views on Somatic Chromosomal Mosaicism. *Genes* 2019, 10, 379. <https://doi.org/10.3390/genes10050379>
3. Sun S, Zhan F, Jiang J, et al. Karyotyping and prenatal diagnosis of 47, XX,+ 8[67]/46, XX [13] Mosaicism: case report and literature review. *BMC Med Genomics*. 2019 Dec 21;12(1):197. <https://doi.org/10.1186/s12920-019-0639-8> PMID: 31864361; PMCID: PMC 6925423.
4. Rüländ AM, Gloning KP, Albig M, et al. The Incidence of Chromosomal Aberrations in Prenatally Diagnosed Isolated Agenesis of the Corpus Callosum. *Ultraschall Med*. 2017 Dec;38(6):626–632. English. <https://doi.org/10.1055/s-0043-113818> Epub 2017 Sep 25. PMID: 28946151.
5. Campbell S, Mavrides E, Prefumo F, et al. Prenatal diagnosis of mosaic trisomy 8 in a fetus with normal nuchal translucency thickness and reversed end-diastolic ductus venosus flow. *Ultrasound Obstet Gynecol*. 2001 Apr;17(4):341–3. <https://doi.org/10.1046/j.1469-0705.2001.00393.x>. PMID: 11339193.
6. Graham, John. (2007). Smith's Recognizable Patterns of Human Deformation. *Smith's Recognizable Patterns of Human Deformation*. <https://doi.org/10.1016/B978-0-7216-1489-2.X1000-4>.
7. Robberecht C, Vanneste E, Pexsters A, et al. Somatic genomic variations in early human prenatal development. *Curr Genomics*. 2010;11(6):397–401. <https://doi.org/10.2174/138920210793175967>
8. Babariya D, Fragouli E, Alfarawati S, et al. The incidence and origin of segmental aneuploidy in human oocytes and preimplantation embryos. *Hum Reprod*. 2017 Dec 1; 32(12):2549–2560. <https://doi.org/10.1093/humrep/dex324>. PMID: 29126206
9. Zhang L, Vijg J. Somatic Mutagenesis in Mammals and Its Implications for Human Disease and Aging. *Annu Rev Genet*. 2018 Nov 23;52:397–419. <https://doi.org/10.1146/annurev-genet-120417-031501> Epub 2018 Sep 13. PMID: 30212236; PMCID: PMC 6414224.
10. Giraldo G, Gómez AM, Mora L, et al. Mosaic trisomy 8 detected by fibroblasts cultured of skin. *Colomb Med (Cali)*. 2016 Jun 30;47(2):100–4. PMID: 27546932; PMCID: PMC4975130. Accessed February 26, 2022 <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4975130/>
11. De S. Somatic mosaicism in healthy human tissues. *Trends Genet*. 2011 Jun;27(6):217–23. <https://doi.org/10.1016/j.tig.2011.03.002> Epub 2011 Apr 14. PMID: 21496937.
12. Yadav VK, DeGregori J, De S. The landscape of somatic mutations in protein coding genes in apparently benign human tissues carries signatures of relaxed purifying selection. *Nucleic Acids Res*. 2016 Mar 18;44(5):2075–84. <https://doi.org/10.1093/nar/gkw086> Epub 2016 Feb 15. PMID: 26883632; PMCID: PMC4797307.
13. McGregor-Schuerman M, Lo Fo Sang A, Bihari S, et al. A child with complementary mosaic trisomy 8 and mosaic trisomy 21; clinical description of Warkany-Down syndrome and mechanism of origin. *Eur J Med Genet*. 2020 Jun;63(6):103922. <https://doi.org/10.1016/j.ejmg.2020.103922> Epub 2020 Mar 30. PMID: 32240827.
14. Hsu LY, Perlis TE. United States survey on chromosome mosaicism and pseudomosaicism in prenatal diagnosis. *Prenat Diagn*. 1984 Spring;4 Spec No:97–130. <https://doi.org/10.1002/pd.1970040708> PMID: 6463035.
15. Iourov IY, Vorsanova SG, Yurov YB. Somatic genome variations in health and disease. *Curr Genomics*. 2010 Sep;11(6):387–96. <https://doi.org/10.2174/138920210793176065> PMID: 21358982; PMCID: PMC3018718.